СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.03.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Колистин-П 12»

1. Торговое наименование.
Колистин-П 12.

2. Международное непатентованное наименование.
Колистин (colistin).

3. Регистрационный номер.
8797-10-24 БА.

4. Лекарственная форма и описание.
Порошок для приема внутрь и приготовления раствора для приема внутрь.
По внешнему виду препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата в качестве действующего вещества содержится 12 000 000 МЕ колистина (эквивалентно 500 мг колистина сульфата), в качестве вспомогательного вещества – глюкоза.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Полимиксины (полипептиды).

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Колистин, действующее вещество препарата, обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных бактерий, таких как *Escherichia coli*, *Salmonella spp*., *Pasteurella spp*., *Bordetella spp*., *Klebsiella spp*., *Pseudomonas aeruginosa* и других.
Механизм действия колистина заключается в нарушении проницаемости цитоплазматической мембраны, что приводит к ее деструкции и лизису бактериальной клетки.
В желудочно-кишечном тракте животных и птицы колистин не разрушается под действием ферментов и практически не всасывается в кровь, благодаря чему создается его высокая концентрация. Колистин не накапливается в органах и тканях, из организма выводится преимущественно в неизменном виде с фекалиями.

8. Показания к применению.
Препарат назначают с лечебной целью телятам, ягнятам, свиньям и сельскохозяйственной птице (бройлерам, племенной птице, птице родительского стада, ремонтному молодняку кур, курам-несушкам) при эшерихиозе (колибактериозе), сальмонеллезе и других инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к колистину.

9. Противопоказания.
Противопоказано применение препарата животным и птице с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, а также с заболеваниями почек и печени. Не рекомендуется применять животным с развитым рубцовым пищеварением.

10. Способ применения и дозы.
Препарат применяют внутрь индивидуально или групповым способом с питьевой водой или в смеси с кормом, в течение 3−5 суток в следующих дозах:

- телятам, ягнятам, свиньям – 100 000 МЕ (что соответствует 8,33 мг препарата) на 1 кг массы тела животного;

- птице – 75 000 МЕ (что соответствует 6,25 мг препарата) на 1 кг массы тела птицы.

Лечебный раствор следует готовить ежедневно. В период применения препарата приготовленный раствор должен быть единственным источником питьевой воды для животных и птицы. В случае, когда это невозможно, например, при использовании пульсдозинга, суточную дозу задают в течение не менее 4 часов или делят на 2 равные части и задают с интервалом 12 часов.

Препарат термостабилен, не теряет своих свойств в процессе термической обработки в течение 15 мин при температуре 100 °С.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных и птицы могут наблюдаться нарушения функций желудочно-кишечного тракта.

13. Беременность и период лактации.

Применение препарата во время беременности и лактации, а также новорожденным животным возможно по назначению ветеринарного врача, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным и птице, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных и птицы с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций. В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, проводят симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не рекомендуется применять препарат одновременно с цефалоспоринами, аминогликозидами, макролидами, тетрациклинами и миорелаксантами.

17. Форма выпуска.

Пакеты из металлизированной полимерной пленки по 0,5 кг и 1 кг и мешки бумажные многослойные с полиэтиленовым покрытием (вкладышем) по 10 кг и 25 кг.

18. Срок годности.

3 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия упаковки – 3 месяца при соблюдении условий хранения. Приготовленный раствор годен в течение 24 часов.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 7 суток, птицы не ранее чем через 3 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Яйцо птицы после применения препарата может быть использовано в пищевых целях без ограничений.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адрес производственной площадки:

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/3; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.02.2026