СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.08.2026г

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Линкомицин-П 200»

1. Торговое наименование.
Линкомицин-П 200.

2. Международное непатентованное наименование.
Линкомицин (lincomycin).

3. Регистрационный номер.
8798-10-24 БА.

4. Лекарственная форма и описание.
Порошок для приема внутрь и приготовления раствора для приема внутрь.
По внешнему виду препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета.

5. Состав.
В 1 г препарата в качестве действующего вещества содержится 200 мг линкомицина гидрохлорида, в качестве вспомогательного вещества – глюкоза.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Линкозамиды.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Линкомицин, действующее вещество препарата, продуцируется *Streptomyces lincolnensis*, оказывает бактериостатическое действие. Эффективен в отношении *Staphylococcus spp., Streptococcus spp.* (в том числе продуцирующих пенициллиназу), *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp., Brachyspira hyodysenteriae, Bacteroides spp., Actinomyces spp.,* а также *Mycoplasma spp., Haemophilus influenzae*.
Механизм действия линкомицина заключается в угнетении синтеза белка на уровне рибосом вследствие связывания антибиотика с 50S-субъединицей и нарушении образования пептидных связей.
Линкомицин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани животного и птицы. Максимальная концентрация в крови достигается через 2–4 часа после применения препарата. Выводится из организма в неизменном виде преимущественно с мочой (до 14 %) и с фекалиями (до 75 %).

8. Показания к применению.
Препарат применяют для лечения свиней и сельскохозяйственной птицы (цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур-несушек) при болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к линкомицину, в том числе при энзоотической пневмонии и дизентерии свиней, некротическом энтерите, микоплазмозе птиц, патологии опорно-двигательного аппарата и бактериальных осложнениях вирусных инфекций, сопровождающихся поражением дыхательной системы.

9. Противопоказания.
Противопоказано применение препарата животным и птице с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, а также при поражении печени, почек. Запрещено применение препарата лошадям, жвачным животным, кроликам.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют внутрь в смеси с кормом или с питьевой водой в следующих суточных дозах:

- свиньям – 0,025–0,05 г препарата на 1 кг массы тела животного (эквивалентно 1–2 г препарата на 40 кг массы тела животного), или 750–1500 г препарата на 1 т корма, или 225–450 г препарата на 1 т питьевой воды в течение 3–5 дней, при энзоотической (микоплазменной) пневмонии, дизентерии в течение 10–14 дней;

- птице – 0,015–0,03 г препарата на 1 кг массы тела птицы (эквивалентно 1,5–3 г препарата на 100 кг массы тела птицы), что составляет 100–400 г препарата на 1 т корма или 50–200 г препарата на 1 т питьевой воды в течение 3–5 дней, при микоплазмозе в течение 10–14 дней, при некротическом энтерите в течение 7 дней.

В период применения препарата приготовленный раствор должен быть единственным источником питьевой воды для животных и птицы.

Водный раствор препарата готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

Препарат термостабилен, не теряет своих свойств в процессе термической обработки в течение 15 минут при температуре 100 ºС.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных и птицы могут наблюдаться нарушение функции желудочно-кишечного тракта, снижение потребления корма. В этом случае препарат отменяют и назначают симптоматическое лечение. Специфических антидотов нет.

13. Беременность и период лактации.

Запрещается применять препарат животным в период беременности и лактации.

14. Особые указания.

В начале применения препарата у свиней может появляться диарея и/или отек слизистой прямой кишки, в редких случаях возможно покраснение кожи. Эти признаки исчезают в течение 5–8 дней без прекращения дачи препарата. Особенностей действия препарата при отмене применения не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным и птице, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозами и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных и птицы с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций и развитие дисбактериоза. В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, проводят симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Противопоказано совместное применение препарата с макролидами и пенициллинами. Не рекомендуется совместное применение препарата с антацидными средствами, а также одновременно с активированным углем, пектином или каолином.

17. Форма выпуска.

Пакеты из металлизированной полимерной пленки по 1 кг и мешки бумажные многослойные с полиэтиленовым покрытием (вкладышем) по 25 кг.

18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия упаковки – 3 месяца при соблюдении условий хранения. Приготовленный раствор годен в течение 24 часов.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 10 суток, птицы – не ранее чем через 3 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее указанного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Запрещается применение препарата птице, яйца которой предназначены в пищу людям.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адрес производственной площадки:

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/3; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.03.2026