СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 41 от 17.06.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Тилвалозин-П»

1. Торговое наименование.
Тилвалозин-П.

2. Международное непатентованное наименование.
Тилвалозин (tylvalosin).

3. Регистрационный номер.
9066-10-24 БА.

4. Лекарственная форма и описание.
Порошок для приема внутрь и приготовления раствора для приема внутрь.
По внешнему виду препарат представляет собой порошок от белого до бежевого цвета, допускается сероватый оттенок.

5. Состав.
В 1 г препарата в качестве действующего вещества содержится 625 мг тилвалозина тартрата, в качестве вспомогательных веществ – глюкоза, лактоза.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Макролиды и азалиды.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Тилвалозин, действующее вещество препарата, обладает бактериостатическим действием в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp*., *Streptococcus spp*., *Diplococcus spp*., *Corynebacterium spp*., *Clostridium spp*., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Moraxella bovis*, *Klebsiella spp*., *Fusobacterium necrophorum*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus spp*., *Pasteurella spp*., *Rickettsia spp*., *Chlamydia spp*., *Lawsonia intracellularis*, *Brachyspira hyodysenteriae*. Микоплазмы высокочувствительны к тилвалозину (*Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma arthritidis*, *Mycoplasma hyosynoviae*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma suipneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae* и *Mycoplasma hyorhinis*).
Механизм действия тилвалозина основан на угнетении биохимических процессов и подавлении биосинтеза белка в микробной клетке на уровне рибосом, путем инактивации фермента транслоказы. Тилвалозин проявляет более высокую антибактериальную активность в сравнении с другими макролидами, что обуславливается образованием активного метаболита – 3-ацетилизовалерилтилозина.
Тилвалозин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, достигая терапевтической концентрации в тканях спустя 1–2 часа. Наиболее высокий уровень тилвалозина достигается в легких, печени, молочной железе и почках. Терапевтическая концентрация антибиотика в крови после однократного применения препарата сохраняется в организме в течение 24 часов. Выводится тилвалозин из организма в виде метаболита 3-ацетилизовалерилтилозина преимущественно с фекалиями (около 70 %), в меньшей степени с мочой.

8. Показания к применению.
Препарат применяют для лечения свиней и птиц (цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур-несушек, птиц родительского стада) при заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тилвалозину.

Препарат назначают птице при хронических респираторных заболеваниях, орнитобактериозе, инфекционном синусите, сальпингите, клостридиозе, некротическом энтерите, диарее, холангиогепатите и других заболеваниях.

Свиньям препарат применяют при энзоотической пневмонии, илеите (пролиферативная энтеропатия у поросят), дизентерии, колите у поросят, инфекционном атрофическом рините, микоплазменном артрите, некротическом энтероколите и других заболеваниях.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным и птице с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, а также при тяжелых поражениях печени и почек.

Не допускается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, ввиду накопления тилвалозина в яйце.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют перорально с кормом или питьевой водой в следующих суточных дозах:

- свиньям – 4–8 мг препарата на 1 кг массы тела животного (эквивалентно 2,5–5 мг тилвалозина тартрата на 1 кг массы тела животного) в течение 5–7 дней;
- птице – 24–40 мг препарата на 1 кг массы тела птицы (эквивалентно 15–25 мг тилвалозина тартрата на 1 кг массы тела птицы) в течение 3–5 дней.

В период применения препарата приготовленный раствор должен быть единственным источником питьевой воды для животных и птицы.

Водный раствор препарата готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление в течение суток.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных и птицы могут наблюдаться нарушение функции желудочно-кишечного тракта, снижение потребления корма. В этом случае препарат отменяют и назначают симптоматическое лечение. Специфических антидотов нет.

13. Беременность и период лактации.

Супоросным и лактирующим свиноматкам препарат применяется при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным и птице, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных и птицы с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций (дерматит, зуд, отек), нарушение пищеварения (рвота, понос). В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, проводят симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не рекомендуется совместное применение препарата с антибиотиками групп пенициллинов, цефалоспоринов, линкозамидов (клиндамицин, линкомицин), амфениколов и рифампицином.

Применение совместно с бентонитом вызывает снижение активности препарата.

Тилвалозин обладает широким спектром совместимости: он потенцирует действие спирамицина, тетрациклина и эритромицина; совместим с сульфаниламидами, аминогликозидами, спектиномицином и эймериостатиками.

17. Форма выпуска.

Пакеты из металлизированной полимерной пленки по 1 кг и мешки бумажные многослойные с полиэтиленовым покрытием (вкладышем) по 25 кг.

18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия упаковки – 3 месяца при соблюдении условий хранения. Приготовленный раствор препарата годен в течение 24 часов.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Запрещается применение препарата птице, яйца которой предназначены в пищу людям.

Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее чем через 3 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее указанного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адрес производственной площадки:

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/3; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 41 от 17.06.2026 г.